

## Informace k péči o zvíře po zákroku vyžadujícím sedaci nebo narkózu

Po zákroku bylo Vaše zvíře umístěno v pooperačním boxu, byly kontrolovány základní životní funkce, podávána infuze, příp. další léky (antibiotika, léky tlumící bolest či zvracení). Zvíře Vám bylo vydáno probrané v maximálně možné míře, orientované, schopné chůze. Většina zvířat má ponechanou nitrožilní kanylu v končetině pro případ komplikací po zákroku či nutnosti podávání dalších léků, a tudíž snadného přístupu do žíly. Pokud není žádný problém, je jim druhý den na kontrole vyjmuta.

1. Po příchodu domů zvíře většinou opět usne (normální postnarkotický spánek). Mělo by ale reagovat na podněty – pohazení, zvuky a jméno. Mělo by být schopno se samo postavit, ujít krátkou vzdálenost.
2. V případě, že je silně otupělé nebo tvrdě spí, nereaguje ani na silné podněty, nebo naopak ve zvýšené míře dává najevo bolest (vytí, kňučení, agresivita) kontaktujte aspoň telefonicky veterinárního lékaře. Pokňourávání však u některých jedinců je normální stav.
3. Pacienta doma umístít v teple a klidu na měkkou, nejlépe absorbující podložku na podlahu či do boxu. Můžete ho položit na elektrickou vyhřívací dečku, či jiný zdroj tepla (gely, pet-lahev s teplou vodou). ! Pozor na popálení ! Nedávat zvíře na křeslo, do blízkosti schodů. Zabránit přístupu dalších zvířat a malých dětí do druhého dne či do nabytí plného vědomí.
4. Dýchání by nemělo být příliš zrychlené a povrchní, s vyplazeným jazykem a nafialovělými, příp.bledými sliznicemi. Můžete kontrolovat tělesnou teplotu v konečníku, která by se měla pohybovat v rozmezí 37,5-39,0 °C. Nemělo by docházet k silným křečovým stavům. Celotělový třes, slabé záškuby končetin či celého těla jsou normální postnarkotickou reakcí organismu.
5. Ojedinelé zvracení ( 1-3x) bývá normální, opakované až úporné už ne. Může se objevit lehčí průjem s příměsí hlenu.
6. Mírné krvácení (ronění) z operační rány je normální, větší množství nebo vytékání permanentní(pokud se nejedná o výtok chřéný- např. z drénů atp.) už ne.
7. Na doporučení veterináře zabránit zvířeti přístupu k ráně – nechat mu nasazený „límeč“ či jiné krytí (pruban).
8. Pítí : pokud to stav dovoluje může zvíře po malých dávkách samo pít zhruba 2 hodiny po příchodu domů. Pít dávejte po malých dávkách s 10-15-ti min. pauzami. Pokud nezvrací, můžete postupně nechat přístup k vodě neomezený. Pít může vodu, nebo oslazený čaj.
9. Jídlo: po 5-6-ti hodinách můžete nabídnout zvířeti kašovitou stravu, nebo nejlépe dietní „rekonvalescentní“ dietu od veterináře. Pokud by zvíře zvracelo, potravu dále nepodávejte.

Pokud se u Vašeho zvířete objeví problémy shora uvedené resp. ve větší míře, nebo pokud si nebudete jeho stavem u Vás doma jisti, neváhejte nás kontaktovat! Pokud dojde k nějakému akutnímu stavu mimo naši ordinační dobu obraťte se prosím na :

IVET – veterinární nemocnice  
Ke Kamýku 996/4  
Praha 4

Tel.: 241 714 358

AA-Vet - veterinární nemocnice  
Chmelová 2920/6  
Praha 10 - Zahradní Město  
Tel.: 271 751 907, 272 652 611

Vet-Centrum - veterinární nemocnice  
K Hájům 946/10  
Praha – Stodůlky  
Tel.: 251 511 651, 251 617 564

Lze také využít služeb veterinární sanitky Pet-Medic, se kterou jezdí buď veterinární lékař nebo zajistí převoz pacienta do nemocnice s nonstop provozem.  
Tel. : 724 184 840